


香港濕地公園



導賞用動植物圖冊
野生動植物篇

教師用



目錄

灣鱷	p.4	荷花	p.30
非洲鯽	p.6	秋茄樹(水筆仔)	p.32
福壽螺	p.8	木欖	p.34
草魚(鯪魚)	p.10	桐花樹(蠟燭果)	p.36
長尾南蜥	p.12	彈塗魚	p.38
蜻蜓和豆娘的生命周期	p.14	弧邊招潮蟹	p.40
斑麗翅蜻	p.16	紅耳鴨	p.42
霸王葉春蜓	p.18	白喉紅臀鴨	p.44
翠胸黃螳	p.20	白頭鴨	p.46
金斑蝶	p.22	大白鷺	p.48
大木林蜘蛛	p.24	小白鷺	p.50
雙齒多刺蟻	p.26	黑臉琵鷺	p.52
睡蓮	p.28	普通鸕鶿	p.54



使用指南

本圖冊介紹了25種香港濕地公園常見的野生動植物。教師進行講解時，可把圖冊向外反摺，向學生展示動植物圖片，同時教師可參考背面的資料，以便進行講解。

其中一些鳥類圖片附有二維條碼 (QR code)，教師可掃描條碼以連結至相關網頁，讓學生聆聽該鳥類的鳴叫聲。

愛護我們的環境，請注意：

- 保持環境安靜，請勿喧嘩、奔跑；
- 不要在公園內野餐，或將食物留在戶外；
- 使用較耐用或可重用的物資，例如可重用的水樽、手巾等；
- 把垃圾放在垃圾箱中或自行帶走，切勿亂拋垃圾；
- 小心照顧兒童，切勿攀越圍欄；
- 珍惜展品，切勿破壞；
- 不要採摘或損毀植物，不要騷擾或捕捉動物；及
- 不要觸摸野生動物、雀鳥羽毛或其排泄物，參觀公園後請洗手。



中文名：灣鱷(別名：鱷魚貝貝)

學名：*Crocodylus porosus*

英文名：Saltwater Crocodile (Nickname: Crocodile Pui Pui)



身體特徵

- 鱷魚貝貝是雌性灣鱷；成年雌性身長約2.5-3米長，而雄性最長可達6-7米，但一般不超過5米
- 爬行類動物，身上有鱗片覆蓋



生境

- 主要於海岸及河口等鹹淡水地區活動，也可在淡水河流及沼澤找到
- 全球廣泛分布，包括印度、斯里蘭卡及澳洲




習性及有趣資料

- 香港沒有野生鱷魚，貝貝可能是在幼時被人非法入口作為寵物或販賣之用
- 貝貝於2003年11月於山貝河被人發現，為免影響公眾安全及生態環境，於2006年8月被濕地公園飼養
- 有時會張開嘴巴伏在地上，幫助調節體溫
- 幼年期會捕食昆蟲、甲殼類動物、細小的爬行動物和魚等；成年後會捕食較大型的動物，如龜、巨蜥、水鳥，甚至是野豬



在香港濕地公園的理想觀察點：貝貝之家



灣鱷

Saltwater Crocodile
Crocodylus porosus



中文名：非洲鯽

學名： *Oreochromis* spp.

英文名： Tilapia



身體特徵

- 中小型魚類，平均長約15-30厘米
- 背部隆聳，兩側扁平，背鰭修長，尾部短鈍
- 軀幹一般為灰褐色，體側具有數條黑色直紋



生境

- 在淡水或沿海的鹹淡水區域均可生存
- 外來入侵物種，原生於非洲；現常見於香港的河流、池塘和水溝，此外本港一些漁塘亦有養殖




習性及有趣資料

- 雜食性，主要進食植物和有機碎屑
- 適應及繁殖能力極強，可在水質惡劣和低氧水體存活，與原生魚類競爭食物和生境
- 雌魚會將卵留在口腔內孵化，藉此提高對魚卵的保護



在香港濕地公園的理想觀察點：濕地工作間、生態探索區及溪畔漫遊徑



非洲鯽

Tilapia


Oreochromis spp.



中文名：福壽螺

學名：*Pomacea canaliculata*

英文名：Golden Apple Snail



身體特徵

- 軟體動物，貝殼呈螺旋狀
- 殼面光滑，有金黃色、深褐色或黑色的條紋
- 平坦的腹足可用來爬行，行動緩慢



生境

- 常見於香港的淡水濕地，如：水稻田
- 外來入侵物種，原產於南美洲，威脅本地的水生生物




習性及有趣資料

- 主要吃水生植物的嫩葉
- 用鰓呼吸，大部分的時間都在水裏活動，只在產卵時離開水面
- 當水體過於污濁時，可利用呼吸管直接呼吸水面上的空氣
- 於離開水面的植物和石頭等表面上產卵，**卵團粉紅色**
- 遇乾旱時緊閉殼蓋，可靜止不動數個月以上



在香港濕地公園的理想觀察點：點水池、生態探索區及溪畔漫遊徑



福壽螺

Golden Apple Snail
Pomacea canaliculata



中文名：草魚(鯪魚)

學名：*Ctenopharyngodon idella*

英文名：Grass Carp



身體特徵

- 草食性淡水魚，平均長度約為60-100厘米
- 體型粗壯延長，吻短而圓鈍，口大無鬚，身披大鱗片



生境

- 中國原生品種，現已引入世界各地，是中國主要的食用魚類之一
- 喜在長有水生植物的湖泊、池塘、河流中層及底層水域棲息




習性及有趣資料

- 草食性，主要食物為浮游植物、藻類等
- 常見的人工飼養品種，可用作食用或控制水生雜草
- 重要的經濟魚類，中國四大家魚之一（其餘三種為鱣魚、青魚和鰱魚）



在香港濕地公園的理想觀察點：濕地工作間及溪畔漫遊徑



草魚(鯪魚)

Grass Carp

Ctenopharyngodon idella



中文名：長尾南蜥

學名：*Eutropis longicaudata*

英文名：Long-tailed Skink



身體特徵

- 軀幹長達十多厘米，尾長可達軀幹長度的兩倍
- 背部的鱗片呈褐色，腹部的鱗片呈綠黃色，身體兩側各有一條深褐色帶



生境

- 主要棲息於樹林邊緣地區及長滿雜草的岩石上




習性及有趣資料

- 主要捕食昆蟲及其他小型無脊椎動物
- 日間較活躍及喜愛在石上曬太陽
- 非常敏捷，當遇到危險時可能會自斷尾部，藉機逃走
- 會在大石下或洞穴中產卵



在香港濕地公園的理想觀察點：濕地工作間及溪畔漫遊徑



長尾南蜥

Long-tailed Skink

Eutropis longicaudata



蜻蜓和豆娘的生命周期



身體特徵

- 蜻蜓和近親豆娘的生命周期相同，包括卵、稚蟲和成蟲三個階段，這個過程被稱為「不完全變態」



習性及有趣資料



- 蜻蜓會把卵產在水中、水生植物表面或莖部內，產卵地點視乎品種而定
- 由卵孵化而成的稚蟲在水中生活
- 蜻蜓稚蟲依靠體內的直腸腮來呼吸；而成蟲則以胸部和腹部的氣孔呼吸
- 當稚蟲即將蛻變時，牠們會沿水生植物或石頭，爬離水面，羽化成為成蟲



在香港濕地公園的理想觀察點：點水池、溪畔漫遊徑及生態探索區



蜻蜓和豆娘的生命周期



中文名：斑麗翅蜻


學名：*Rhyothemis variegata arria*

英文名：Variegated Flutterer



身體特徵

- 中型蜻蜓，腹部長約22-27毫米
- 前翅和後翅布滿鮮艷的黑黃色圖案，飛行時容易與蝴蝶混淆
- 雄性和雌性的翅膀顏色相似，但雌性前翅翅尖透明



生境

- 生活於沼澤、池塘以及人工水池
- 廣泛分布，種群主要生活於新界西北部




習性及有趣資料

- 本港少數翅膀擁有鮮艷花紋的蜻蜓



在香港濕地公園的理想觀察點：點水池、溪畔漫遊徑及生態探索區



斑麗翅蜻

Variegated Flutterer
Rhyothemis variegata arria



中文名：霸王葉春蜓

學名：*Ictinogomphus pertinax*

英文名：Common Flangetail



身體特徵

- 大型蜻蜓，腹部長約51-54毫米
- 合胸和腹部黑色，並有黃色條紋
- 腹部末端附近有黑色的葉突



生境

- 主要於池塘和靜水出沒，亦會出沒於河流以及人工水池
- 廣泛分布於香港



習性及有趣資料

- 領域性十分強，會主動驅逐入侵的蜻蜓
- 喜歡停於突出水面的植物或枝頭上
- 相對雄性，雌性較少出沒，主要在繁殖地點交尾和產卵時才會看到其蹤影



在香港濕地公園的理想觀察點：點水池、溪畔漫遊徑及生態探索區



霸王葉春蜓

Common Flangetail
Ictinogomphus pertinax



中文名：翠胸黃蟬

學名：*Ceriagrion auranticum ryukyuanum*

英文名：Orange-tailed Sprite



身體特徵

- 中型豆娘，腹部長約28-35毫米
- 雄性複眼綠色，合胸橄欖綠色，腹部橙紅色，雌性顏色較淡




生境

- 常見於池塘邊、沼澤、棄田或水體附近的草地



習性及有趣資料

- 肉食性，而且頗具攻擊性，會吃掉體型較小的豆娘
- 成蟲的活動期較其他品種長，從春天至初冬都可發現牠們的蹤影



在香港濕地公園的理想觀察點：點水池、溪畔漫遊徑及生態探索區





翠胸黃螳

Orange-tailed Sprite

Ceriagrion auranticum ryukyuanum

中文名：金斑蝶

學名：*Danaus chrysippus*

英文名：Plain Tiger



身體特徵

- 黑色的身體上有很多白色斑點
- 翅膀呈橙黃色，邊緣有黑色和白色斑紋
- 雄蝶比雌蝶略小，後翅有一囊狀性標
- 一對前足退化



生境

- 常見於有幼蟲寄主植物-馬利筋生長的郊野地區及林地



習性及有趣資料

- 經常徘徊於幼蟲寄主植物-馬利筋
- 幼蟲會把馬利筋的毒素存於體內作為防禦捕食者的武器，而成蟲亦帶有毒性
- 成蟲和幼蟲顏色鮮艷，以警告捕獵者其毒性



在香港濕地公園的理想觀察點：蝴蝶園



金斑蝶

Plain Tiger

Danaus chrysippus



中文名：大木林蜘蛛
學名：*Nephila pilipes*



身體特徵

- 因背部花紋貌似人臉，又稱「人面蜘蛛」
- 雄蜘蛛較為細小，橙色，大約只有雌蜘蛛的五分之一
- 香港體型最大的原生蜘蛛之一



生境

- 廣泛居於溫暖地區，亞洲、非洲和美洲均可見其蹤影



習性及有趣資料

- 在樹林和路旁的叢林結網，然後站在網的中央等待獵物，主要捕食昆蟲
- 長有毒牙，當蜘蛛網截獲昆蟲後，會注入毒液麻痹獵物，並從腹部排出蜘蛛絲捆綁獵物
- 攝食時會先把消化液注入獵物體內，等待組織被消化後，再吸取其汁液



在香港濕地公園的理想觀察點：環迴徑



大木林蜘蛛

Nephila pilipes



中文名：雙齒多刺蟻

學名：*Polyrhachis dives*

英文名：Spiny Ant



身體特徵

- 身體長約4-6毫米，主要呈黑色，有時呈褐色
- 身上有一層淺黃色或銀灰色的柔毛，工蟻後腹有一黃色橫紋



生境

- 主要於樹上建巢，亦有少部分建於石塊下及草叢
- 蟻巢外型像蜂巢，以木屑和草葉碎片築成



習性及有趣資料

- 以植物的汁液、蚜蟲的分泌物及小型的昆蟲為食
- 會捕食侵食植物的毛蟲
- 如蟻巢受到干擾，大量工蟻會迅速防衛



在香港濕地公園的理想觀察點：溪畔漫遊徑、演替之路及環迴徑



雙齒多刺蟻

Spiny Ant
Polyrhachis dives



中文名：睡蓮

學名： *Nymphaea* spp.

英文名： Water-lily



身體特徵

- 葉片浮在水面上
- 由柔軟的葉柄連接至水底的根狀莖
- 葉緣有缺口
- 花的顏色包括白、粉紅、紫、紫紅、黃等



生境

- 常見於淡水沼澤、池塘及人工水池



習性及有趣資料

- 引入香港作園藝品種種植
- 花期為每年的五至八月
- 睡蓮花朵一般會在日間開放、傍晚閉合，就像晚上要休息一般



在香港濕地公園的理想觀察點：溪畔漫遊徑、點水池及演替之路





睡蓮

Water-lily
Nymphaea spp.

中文名：荷花

學名： *Nelumbo nucifera*

英文名： Indian Lotus



身體特徵

- 葉為鮮綠色，**盾形**
- 花和葉由長柄挺出水面
- 葉片表面有一層絨毛，令葉上的水珠快速流走



生境

- 平靜的湖沼、澤地、池塘



習性及有趣資料

- 多年生的水生植物
- 每年六至八月開花，花期只得三至四天
- 待花瓣凋謝，蓮蓬會脹大，內部載有蓮子
- 各部分有不同用途，例如蓮子和蓮藕是常見的食材；而荷葉和蓮蓬可作為涼茶材料



在香港濕地公園的理想觀察點：濕地工作間、演替之路及點水池



荷花

Indian Lotus

Nelumbo nucifera



中文名：秋茄樹（水筆仔）

學名：*Kandelia obovata*



身體特徵

- 胚軸綠色，末端尖細呈筆桿狀
- 花呈白色，有五至六片萼片



生境

- 在香港廣泛分布於鹹淡水河口及海岸區域，如：新界西北、西貢、吐露港等



習性及有趣資料

- 香港最常見的紅樹品種之一
- 胚軸看似一枝筆，故又名水筆仔
- 以胎生苗（胚軸）形式繁殖，胚軸在未脫離母株前已開始生長
- 胚軸成熟及脫落後，只要遇到合適的環境固定下來，就可以快速長成樹苗
- 支柱根用來擴闊樹基，從而穩定在鬆軟泥土上生長的紅樹



在香港濕地公園的理想觀察點：紅樹林浮橋



秋茄樹(水筆仔)

Kandelia obovata

中文名：木欖

學名：*Bruguiera gymnorhiza*

英文名：Many-petaled Mangrove



身體特徵

- 胚軸為圓柱形，呈雪茄狀
- 組織富含丹寧酸，令木欖的組織顏色偏紅
- 花萼呈深紅色，葉子闊大而兩端呈尖



生境

- 在香港廣泛分布於鹹淡水河口及海岸區域，如：新界西北、西貢、吐露港等



習性及有趣資料

- 以胎生苗（胚軸）形式繁殖，胚軸在未脫離母株前已開始生長
- 胚軸成熟及脫落後，只要遇到合適的環境固定下來，就可以快速長成樹苗
- 突出泥面的膝狀根，可在空氣中進行氣體交換
- 樹液含有丹寧酸，可避免蟲害咬食植株，亦有人利用丹寧酸作為天然染料



在香港濕地公園的理想觀察點：紅樹林浮橋



木欖

Many-petaled Mangrove
Bruguiera gymnorhiza

中文名：桐花樹（蠟燭果）

學名： *Aegiceras corniculatum*



身體特徵

- 葉面較圓，葉柄呈微紅色，葉尖微凹
- 葉具有鹽腺
- 胚軸又彎又尖，形似「蠟燭」，故又名蠟燭果



生境

- 在香港廣泛分布於鹹淡水河口及海岸區域，如：新界西北、西貢、吐露港等



習性及有趣資料

- 香港最常見的紅樹品種之一
- 體內多餘的鹽分會由葉面的鹽腺排出，以適應高鹽度的生長環境
- 以胎生苗（胚軸）形式繁殖，胚軸在未脫離母株前已開始生長
- 胚軸成熟及脫落後，只要遇到合適的環境固定下來，就可以快速長成樹苗
- 突出泥面的膝狀根，可在空氣中進行氣體交換



在香港濕地公園的理想觀察點：紅樹林浮橋



桐花樹(蠟燭果)

Aegiceras corniculatum

中文名：彈塗魚，大彈塗魚

學名：*Periophthalmus modestus*, *Boleophthalmus pectinirostris*

英文名：Shuttles Hoppfish, Great Blue Spotted Mudskipper



身體特徵

- 彈塗魚：身長約5-7厘米；全身灰褐色，長滿深色小黑斑，體側有數條深灰色的寬橫帶
- 大彈塗魚：身長約8-12厘米；全身深灰色，帶有金屬藍色小點
- 擁有可向前彎曲的肉質化胸鰭，像手臂一樣幫助牠們在泥灘上爬行



生境

- 生活於潮間帶的泥灘，亦會依附在紅樹的樹幹或石頭上
- 會於泥灘上挖洞穴居



習性及有趣資料

- 魚類，非兩棲類；因為牠們用鰓呼吸，也有一般魚類擁有的魚鱗、魚鰭和魚尾等特徵
- 彈塗魚是肉食性，以小型無脊椎動物為主食；而大彈塗魚是草食性，潮退時在泥灘上尋找藻類為主食
- 鰓室可以儲水，皮膚亦可幫助呼吸，所以可離水覓食



在香港濕地公園的理想觀察點：紅樹林浮橋



A photograph of a Shuttles Hoppfish (Periophthalmus modestus) resting on a dark, wet rock. The fish has a mottled pattern of dark spots on a lighter background, with a prominent white stripe running along its side. It is facing right, with its head slightly raised.

彈塗魚

Shuttles Hoppfish
Periophthalmus modestus

A photograph of a Great Blue Spotted Mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris) in a shallow, muddy pond. The fish is dark grey with numerous small, light blue spots. It is facing left, with its head slightly raised.

大彈塗魚

Great Blue Spotted Mudskipper
Boleophthalmus pectinirostris

中文名：弧邊招潮蟹

學名：*Uca arcuata*



身體特徵

- 身體大致呈紅色
- 雄蟹擁有一隻大螯（音：熬）足（鉗）和一隻小螯足；雌蟹則擁有兩隻小螯足



生境

- 生活於潮間帶的泥灘及紅樹林
- 會於泥灘上挖洞穴居



習性及有趣資料

- 雄蟹會揮舞大螯足，以守護領土和吸引異性，小螯足則負責覓食
- 招潮蟹會於潮退時在泥灘上覓食，而雄蟹揮舞大螯足的動作像把潮水招來，所以被稱為「招潮蟹」
- 口部可過濾泥中的微小食物顆粒，包括碎屑、藻類、細菌和微生物，然後吐出經過濾的沙粒



在香港濕地公園的理想觀察點：紅樹林浮橋



弧邊招潮蟹

Uca arcuata



中文名：紅耳鵯

學名：*Pycnonotus jocosus*

英文名：Red-whiskered Bulbul



身體特徵

- 小型鳥類，身長約20厘米
- 成鳥頭頂有黑色的冠羽及紅色的耳羽；幼鳥則沒有紅色的耳羽
- 臀部呈橙紅色



生境

- 十分常見並廣泛分布於香港的留鳥
- 喜歡棲息於開闊原野、林地及市區



習性及有趣資料

- 主要進食果實與昆蟲
- 經常集體出現
- 叫聲清脆響亮



在香港濕地公園的理想觀察點：公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢



A photograph of a Red-whiskered Bulbul perched on a thin branch. The bird has a black crown with a prominent crest, a white face with a red stripe through the eye, and a grey body with a red patch on the lower back. The background is a blurred green forest. The photo is framed by a thick, light-brown oval border. Scattered around the border are small, stylized leaves in shades of orange, green, and brown.

紅耳鵲

Red-whiskered Bulbul
Pycnonotus jocosus



中文名：白喉紅臀鶇

學名：*Pycnonotus aurigaster*

英文名：Sooty-headed Bulbul



身體特徵

- 小型鳥類，身長約20厘米
- 成鳥頭頂的黑色冠羽微微隆起
- 上身灰褐色，喉部及腹部為灰白色
- 臀部呈紅色，幼鳥臀部偏黃色



生境

- 留鳥，廣泛分布於香港的開闊原野
- 喜歡較為空曠的地方，常於矮樹叢及林邊出沒



習性及有趣資料

- 主要進食果實和昆蟲
- 叫聲悅耳



在香港濕地公園的理想觀察點：濕地探索中心和演替之路旁的樹叢



白喉紅臀鵲

Sooty-headed Bulbul
Pycnonotus aurigaster



中文名：白頭鵪

學名：*Pycnonotus sinensis*

英文名：Chinese Bulbul



身體特徵

- 小型鳥類，身長約19厘米
- 成鳥後枕呈白色，背部為橄欖綠色；幼鳥後枕則沒有白色
- 面上有白斑，腹部呈灰色



生境

- 十分常見並廣泛分布於香港的留鳥
- 常見於濕地、林地、開闊原野及市區



習性及有趣資料

- 主要進食果實，有時亦會捕食昆蟲
- 經常集體出現
- 叫聲清脆響亮



在香港濕地公園的理想觀察點：公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢



白頭鵲

Chinese Bulbul

Pycnonotus sinensis



中文名：大白鷺

學名： *Ardea alba*

英文名： Great Egret



身體特徵

- 大型鷺鳥，身長約90厘米
- 全身白色，頸部較長；喙(嘴)黃色(繁殖期黑色)，而雙腳及腳趾黑色
- 嘴的基部裂痕直達眼部後方



生境

- 常見並廣泛分布於香港的留鳥及冬候鳥
- 喜於溪流、鹹淡水濕地及淡水濕地活動



習性及有趣資料

- 喜歡靜靜佇立於岸邊的淺水區覓食，主要捕食魚類
- 飛行時會把長頸縮起，呈“S”型（見圖）
- 叫聲似「閣 — 閣 —」聲



在香港濕地公園的理想觀察點：河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及魚塘觀鳥屋



A Great Egret is shown in flight, its long neck curved and its wings spread wide. It is holding a small blue bird in its beak. The background is a soft, out-of-focus landscape with water and trees. The entire scene is framed within a large, rounded, light-brown border. There are small, stylized green leaves and orange-brown petals scattered around the border.

大白鷺

Great Egret
Ardea alba

中文名：小白鷺

學名：*Egretta garzetta*

英文名：Little Egret



身體特徵

- 中至小型鷺鳥，體長約61厘米
- 全身羽毛白色，頸部修長，黑色喙（嘴），黑腳，黃腳趾
- 繁殖期時，頭後會長出一對飾羽（見圖）



生境

- 常見並廣泛分布於香港海岸的留鳥
- 喜於溪流、鹹淡水濕地、淡水濕地、市區和海岸活動



習性及有趣資料

- 主要進食魚類
- 覓食時常靜立於水邊，待獵物接近時迅速捕食
- 叫聲為沙啞的「呀 — 呀 —」聲



在香港濕地公園的理想觀察點：河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及魚塘觀鳥屋





小白鷺

Little Egret
Egretta garzetta

中文名：黑臉琵鷺

學名：*Platalea minor*

英文名：Black-faced Spoonbill



身體特徵

- 大型水鳥，身長約76厘米
- 全身為白色羽毛，臉和腳呈黑色，喙(嘴)部呈匙狀或琵琶狀
- 繁殖期時，羽冠和頸部呈黃色



生境

- 冬候鳥。於初春時，牠們會飛返原居地包括中國北部、韓國等
- 喜於鹹淡水濕地及淡水濕地活動，例如：河口



習性及有趣資料

- 專門捕食淺水中的魚類和水生動物
- 覓食時會把匙狀的喙部放入水中左右移動
- 瀕危動物



在香港濕地公園的理想觀察點：訪客中心觀景廊、河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋





黑臉琵鷺

Black-faced Spoonbill

Platalea minor

中文名：普通鸕鶿

學名：*Phalacrocorax carbo*

英文名：Great Cormorant



身體特徵

- 大型水鳥，體長約86厘米
- 全身黑色，面部呈黃色，喙（嘴）端呈鈎狀
- 趾間有蹼，幫助牠們潛泳



生境

- 常見的冬候鳥，每年約有數千至一萬隻在香港度冬
- 主要見於鹹淡水濕地、淡水濕地及海岸



習性及有趣資料

- 覓食時會潛進水中捕魚
- 潛水專家。全身的羽毛並不防水，羽毛被水浸泡後較易吸水，身體的浮力減低，有助牠們潛進水中。而且趾間有蹼，足部是強而有力的水底推進器
- 潛水後，愛在岸邊展開雙翼曬日光浴，以加快弄乾濕透的羽毛
- 喜愛群居，常集體列隊成“V”字型飛行



在香港濕地公園的理想觀察點：訪客中心觀景廊、河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



普通鸕鷀

Great Cormorant
Phalacrocorax carbo





參觀守則

- 觀察和拍攝時不要干擾野生動植物
- 行走時要保持慢速和安靜，不要追趕和驚嚇野生動物
- 盡量在道路或小徑上行走，不要亂闖進路旁生境
- 穿著與自然色彩配合的衣服，以免容易被野生動物察覺
- 將有關參觀注意事項與他人分享，並以身作則

香港濕地公園

地址：香港新界天水圍濕地公園路

電話：3152 2666

傳真：3152 2668

網址：www.wetlandpark.gov.hk



©2019香港濕地公園