



赤頸鴨 Eurasian Wigeon  
*Anas penelope*

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：赤頸鴨

學名：*Anas Penelope*

## 身體特徵

- ◆ 中型鴨類，身長約 48 厘米。
- ◆ 噠(嘴)部灰色，近喙端部份黑色。
- ◆ 擁有像蛙鞋般的蹼足，幫助牠們游泳。
- ◆ 臨近春季時，雄鳥會換上繁殖羽，頭部變成赤褐色，額頭轉為顯眼的奶黃色。

## 居留狀況及生境

- ◆ 常見的冬候鳥。
- ◆ 常見於淡水及鹹淡水濕地。

## 習性及有趣資料

- ◆ 喜歡成群活動，有時會發出「標 - 標 - 」的叫聲。
- ◆ 有危險時可以直接從水中或地面起飛。
- ◆ 主要食用岸邊及水中的植物。

## 在香港濕地公園的理想觀察點

- ◆ 河畔觀鳥屋和泥灘觀鳥屋



針尾鴨 Northern Pintail  
*Anas acuta*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：針尾鴨

學名：*Anas acuta*

### 身體特徵

- 中至大型鴨類，身長約 55 厘米。
- 帶修長的頸部。尾部有幼長的尾羽。
- 雄鴨褐色的頭部與白色的頸項對比明顯。

### 居留狀況及生境

- 常見的冬候鳥。
- 主要在鹹淡水濕地及淡水濕地出沒。

### 習性及有趣資料

- 覓食水生植物、水生昆蟲及小魚為主。
- 在淺水區覓食時，經常會將頭栽到水裡，身軀前半潛入水中，臀部朝天，形成在水中倒吊的姿勢。

在香港濕地公園  
的理想觀察點



黑臉琵鷺 Black-faced Spoonbill  
*Platalea minor*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：黑臉琵鷺

學名：*Platalea minor*

### 身體特徵

- ◆ 大型水鳥，身長約 76 厘米。
- ◆ 全身為白色羽毛，臉和腳呈黑色，喙(嘴)部呈匙狀或琵琶狀。
- ◆ 繁殖期時，羽冠和頸部呈黃色。

### 居留狀況及生境

- ◆ 常見的冬候鳥，曾記錄於后海灣一帶。原居地包括中國北部、韓國等。
- ◆ 喜於鹹淡水濕地及淡水濕地活動，例如：河口。

### 習性及有趣資料

- ◆ 專門捕食淺水中的魚類和水生動物。
- ◆ 覓食時會把匙狀的喙部放入水中左右移動。
- ◆ 黑臉琵鷺是瀕危動物，全球只剩下約四千隻。

### 在香港濕地公園的理想觀察點

- ◆ 訪客中心觀景廊、河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



夜鷺 Black-crowned Night Heron  
*Nycticorax nycticorax*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：夜鷺

學名：*Nycticorax nycticorax*

### 身體特徵

- ◆ 中型鷺鳥，身長約 61 厘米。
- ◆ 成鳥頭頂至背部深藍色，其餘部份灰白色。繁殖期後枕有 2 至 3 條飾羽，以吸引異性。
- ◆ 幼鳥深褐色，有白色斑點。

### 居留狀況及生境

- ◆ 常見的留鳥，亦有部份是冬候鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 喜於沼澤、河道、池塘等濕地活動。

### 習性及有趣資料

- ◆ 專門捕食魚類及水生動物 (如：蛙類)。
- ◆ 覓食時通常站立於水邊不動，待獵物游近時才捕食。
- ◆ 受驚飛起時會發出「哇、哇……」的叫聲。

### 在香港濕地公園 的理想觀察點

- ◆ 河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋

繁殖羽 Bleeding plumage



池鷺 Chinese Pond Heron  
*Ardeola bacchus*

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：池鷺

學名：*Ardeola bacchus*

## 身體特徵

- ◆ 小型鷺鳥，體長約 46 厘米。
- ◆ 喙(嘴)和腳黃色，除腹部和翅膀白色外，全身褐色，頭、頸和胸有直紋。
- ◆ 繁殖季節會換上繁殖羽，頭、頸變成深酒紅色和背部變成藍灰色。

## 居留狀況及生境

- ◆ 常見的留鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 廣泛分佈於紅樹林、沼澤、稻田、魚塘和河流的淺水處。

## 習性及有趣資料

- ◆ 主要捕食昆蟲、魚類和蝦蟹。
- ◆ 喜歡在淺水中涉水覓食。
- ◆ 會在樹上棲息並築巢。

## 在香港濕地公園 的理想觀察點

- ◆ 生態探索區、河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



蒼鷺 Grey Heron  
*Ardea cinerea*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：蒼鷺

學名：*Ardea cinerea*

### 身體特徵

- ◆ 大型鷺鳥，體長約 98 厘米。
- ◆ 羽毛以黑，白，灰三色為主，頭上有一黑斑。
- ◆ 幼鳥顏色主要為淡灰色。

### 居留狀況及生境

- ◆ 常見的留鳥及冬候鳥。
- ◆ 常見於淡水濕地及鹹淡水濕地。

### 習性及有趣資料

- ◆ 喜歡單獨覓食。
- ◆ 常站立於水邊等待魚游近後快速啄食。
- ◆ 叫聲似「閣 - 閣 - 」聲。

在香港濕地公園的理想觀察點 ◆ 河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及魚塘觀鳥屋



大白鷺 Great Egret  
*Ardea alba*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：大白鷺

學名：*Ardea alba*

### 身體特徵

- 大型鷺鳥，身長約 90 厘米。
- 全身白色，頸部較長。喙(嘴)黃色(繁殖期黑色)，而雙腳及腳趾黑色。
- 嘴的基部裂痕直達眼部後方。

### 居留狀況及生境

- 常見的留鳥及冬候鳥。廣泛分布於香港。
- 喜於鹹淡水濕地、淡水濕地及溪流活動。

### 習性及有趣資料

- 喜歡靜靜佇立於岸邊的淺水區覓食，主要捕食魚類。
- 飛行時會把長頸縮起。
- 受驚飛起時，會發出「呀-呀-」的叫聲。

### 在香港濕地公園 的理想觀察點

- 河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及魚塘觀鳥屋



小白鷺 Little Egret  
*Egretta garzetta*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：小白鷺

學名：*Egretta garzetta*

身體特徵

- ◆ 小型鶲鳥，體長約 61 厘米。
- ◆ 全身羽毛白色，頸部修長，黑喙(嘴)，黑腳，黃腳趾。
- ◆ 繁殖期頭後會長出一對飾羽。

居留狀況及生境

- ◆ 常見的留鳥。廣泛分布於香港的海岸。
- ◆ 喜於溪流、鹹淡水濕地、淡水濕地、市區和海岸活動。

習性及有趣資料

- ◆ 主要進食魚類。
- ◆ 覓食時常靜立於水邊，待獵物接近時迅速捕食。
- ◆ 叫聲為沙啞的「呀呀」聲。

在香港濕地公園  
的理想觀察點

- ◆ 河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及魚塘觀鳥屋



普通鷗  
Great Cormorant  
*Phalacrocorax carbo*

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：普通鷗鷩

學名：*Phalacrocorax carbo*

## 身體特徵

- ◆ 大型水鳥，體長約 86 厘米。
- ◆ 全身黑色，面部呈黃色，喙(嘴)端呈鉤狀。
- ◆ 趾間有蹼，幫助牠們潛泳。

## 居留狀況及生境

- ◆ 常見的冬候鳥，每年約有數千至一萬隻在香港度冬。
- ◆ 主要見於鹹淡水濕地、淡水濕地及海洋沿岸。

## 習性及有趣資料

- ◆ 竄食時會潛進水中捕魚。
- ◆ 普通鷗鷩是潛水專家。牠們全身的羽毛並不防水，羽毛被水浸泡後較易吸水，身體的浮力減低，有助牠們潛進水中。而且牠們的趾間有蹼，足部是強而有力的水底推進器。
- ◆ 潛水後，牠們愛在岸邊展開雙翼曬日光浴，以加快弄乾濕透的羽毛。
- ◆ 喜愛群居，常集體列隊成“V”字型飛行。

## 在香港濕地公園的理想觀察點

- ◆ 訪客中心觀景廊、河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



白胸苦惡鳥 White-breasted  
Waterhen  
*Amaurornis phoenicurus*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：白胸苦惡鳥

英文名：White-breasted Waterhen

學名：*Amaurornis phoenicurus*

### 身體特徵

- 大型秧雞，身長約 33 厘米。
- 成鳥臉頰至上腹呈白色，背部深褐色，臀部呈鮮栗色。
- 幼鳥全身長滿淡褐色的羽毛，與成鳥一樣擁有長腳趾。

### 居留狀況及生境

- 常見的留鳥。廣泛分布於香港的濕地。
- 廣泛分佈於鹹淡水濕地、淡水濕地、溪流、開闊原野及市區。

### 習性及有趣資料

- 主要捕食昆蟲及魚類。
- 步行時頭前後擺動，尾巴上下搖動。
- 會發出普通話「苦惡 - 苦惡 - 」的叫聲。

在香港濕地公園的理想觀察點

- 河畔觀鳥屋及濕地探索中心旁

黑翅長腳鶲 Black-winged Stilt  
*Himantopus himantopus*



農業、漁務及  
自然護理處



環保局  
Environmental Protection  
Department

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：黑翅長腳鶲

學名：*Himantopus himantopus*

## 身體特徵

- ◆ 中型涉禽，身長約 37 厘米。
- ◆ 體羽黑白分明，背部及翅膀呈黑色，頭、頸、尾及腹部白色為主。
- ◆ 體型修長，具有一雙粉紅色長腳。

## 居留狀況及生境

- ◆ 本港常見的春秋過境遷徙鳥和不常見的冬候鳥。
- ◆ 見於鹹淡水濕地及淡水濕地。

## 習性及有趣資料

- ◆ 主要捕捉體型細小的魚類、昆蟲、蝌蚪等作食物。
- ◆ 因為擁有一雙長腳，能在比較深水的地方覓食。
- ◆ 喜愛於近水位置築起細小的鳥巢及產卵，在香港濕地公園也有牠們築巢繁殖的紀錄。

在香港濕地公園的理想觀察點 ◆ 河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



反嘴鶲 Pied Avocet

*Recurvirostra avosetta*

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：反嘴鶲

英文名：Pied Avocet

學名：*Recurvirostra avosetta*

### 身體特徵

- ◆ 中型鶲鳥，體長約 44 厘米。
- ◆ 噬(嘴)黑色，幼長而上翹。
- ◆ 全身羽毛黑白分明。

### 居留狀況及生境

- ◆ 十分常見的冬候鳥。
- ◆ 主要見於鹹淡水濕地。

### 習性及有趣資料

- ◆ 獵食時會將嘴插入水中左右擺動，掃食淺水中的食物。
- ◆ 主要進食水生小型動物，如：蝦、螺類等。

### 在香港濕地公園 的理想觀察點

- ◆ 河畔觀鳥屋及泥灘觀鳥屋



珠頸斑鳩 Spotted Dove  
*Spilopelia chinensis*



珠頸斑鳩鳴叫聲



# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：珠頸斑鳩

英文名：Spotted Dove

學名：*Spilopelia chinensis*

## 身體特徵

- ◆ 中型鳥類，身長約 30 厘米。
- ◆ 身體褐色，後頸黑色，佈滿白斑。
- ◆ 幼鳥通常頸上沒有黑白色斑。

## 居留狀況及生境

- ◆ 十分常見的留鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 廣泛分佈於開闊原野、林地及市區。

## 習性及有趣資料

- ◆ 常於地上覓食。
- ◆ 以種子為主要食物，亦會捕食昆蟲。
- ◆ 叫聲為低沉的「咕咕」聲。

## 在香港濕地公園

的理想觀察點 ◆ 公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢或草地



普通翠鳥 Common Kingfisher  
*Alcedo atthis*



普通翠鳥鳴叫聲

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：普通翠鳥

學名：*Alcedo atthis*

## 身體特徵

- 小型翠鳥，身長約 16 厘米。
- 顏色鮮豔，身體主要為藍色和橙褐色，腳部呈紅色。
- 尾部短，喙(嘴)部長而堅硬。雄鳥嘴黑色，雌鳥上嘴黑色而下嘴紅色。

## 居留狀況及生境

- 常見的冬候鳥和過境遷徙鳥，及不常見的夏候鳥。廣泛分布於香港的濕地。
- 喜於溪流、開闊原野、濕地和市區活動。

## 習性及有趣資料

- 專門捕食細小魚類、水生昆蟲和甲殼類動物。
- 捕食時經常佇立於貼近水面的地方，或在空中盤旋。
- 找到獵物時會俯衝入水中捕捉。

在香港濕地公園的理想觀察點



紅耳鵙 Red-whiskered Bulbul  
*Pycnonotus jocosus*



紅耳鵙鳴叫聲

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：紅耳鶇

學名：*Pycnonotus jocosus*

## 身體特徵

- ◆ 小型鳥類，身長約 20 厘米。
- ◆ 成鳥頭頂有黑色的冠羽及紅色的頰斑；幼鳥則沒有紅色的頰斑。
- ◆ 臀部呈橙紅色。

## 居留狀況及生境

- ◆ 十分常見的留鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 喜歡棲息於開闊原野，林地及市區。

## 習性及有趣資料

- ◆ 主要進食果實與昆蟲。
- ◆ 群居鳥類，經常集體出現。
- ◆ 叫聲清脆響亮。

## 在香港濕地公園的理想觀察點

- ◆ 公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢



白頭鵙 Chinese Bulbul  
*Pycnonotus sinensis*



白頭鵙鳴叫聲

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：白頭鵙

學名：*Pycnonotus sinensis*

## 身體特徵

- ◆ 小型鳥類，身長約 19 厘米。
- ◆ 成鳥頭頂後部呈白色，背部為橄欖綠色；幼鳥頭頂後部則沒有白色。
- ◆ 面上有白斑，腹部呈灰色。

## 居留狀況及生境

- ◆ 十分常見的留鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 廣泛分佈於濕地、林地、開闊原野及市區。

## 習性及有趣資料

- ◆ 主要進食果實，有時亦會捕食昆蟲。
- ◆ 群居鳥類，經常集體出現。
- ◆ 叫聲清脆響亮。

## 在香港濕地公園 的理想觀察點

- ◆ 公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢



白喉紅臀鵙 Sooty-headed Bulbul  
*Pycnonotus aurigaster*



## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：白喉紅臀鵙

英文名：Sooty-headed Bulbul

學名：*Pycnonotus aurigaster*

### 身體特徵

- ◆ 小型鳥類，身長約 20 厘米。
- ◆ 成鳥頭頂的黑色冠羽僅微微隆起。
- ◆ 身體灰褐色，喉部及腹部為灰白色。
- ◆ 臀部呈紅色，幼鳥臀部偏黃色。

### 居留狀況及生境

- ◆ 少見的留鳥。廣泛分布於香港空曠的地方。
- ◆ 喜歡較為空曠的地方，常於矮樹叢及林邊出沒。

### 習性及有趣資料

- ◆ 主要進食果實和昆蟲。
- ◆ 叫聲悅耳。

### 在香港濕地公園

#### 的理想觀察點

- ◆ 濕地探索中心和演替之路旁的樹叢

黑臉噪鶥 Masked Laughingthrush  
*Garrulax perspicillatus*



黑臉噪鶥鳴叫聲



## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：黑臉噪鶥

英文名：Masked Laughingthrush

學名：*Garrulax perspicillatus*

### 身體特徵

- ◆ 中型鳥類，身長約 30 厘米。
- ◆ 身體褐色，有黑色闊臉罩，臀部黃褐色。

### 居留狀況及生境

- ◆ 常見的留鳥。廣泛分布於香港的灌木林。
- ◆ 見於開闊原野、林地及市區。

### 習性及有趣資料

- ◆ 常於地上跳躍覓食。
- ◆ 主要以果實和昆蟲為食物。
- ◆ 經常小群活動，加上發出響亮而刺耳的「標標」叫聲，比較吵鬧，故又稱「七姊妹」。

在香港濕地公園的理想觀察點 ◆ 濕地公園內行人路旁的灌木叢和草地



鵲鶲 Oriental Magpie Robin  
*Copsychus saularis*



鵲鶲鳴叫聲

# 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：鵙鴝

學名：*Copsychus saularis*

## 身體特徵

- 小型鳥類，身長約 19 - 21 厘米。
- 雄鳥的羽毛為藍黑色和白色。
- 雌鳥的羽毛以深灰色代替藍黑色。

## 居留狀況及生境

- 常見的留鳥。廣泛分布於香港。
- 廣泛分佈於鹹淡水濕地，開闊原野，林地及市區。

## 習性及有趣資料

- 主要捕食昆蟲。
- 休息時常上下擺動尾巴。
- 叫聲悅耳，常模仿其他鳥類的叫聲。

## 在香港濕地公園的理想觀察點

- 公園內各處如：溪畔漫遊徑、生態探索區旁樹叢

白鶲鵠 White Wagtail  
*Motacilla alba*



白鶲鵠鳴叫聲

## 香港濕地公園常見生物資料圖卡

中文名：白鶲鴒

學名：*Motacilla alba*

### 身體特徵

- ◆ 小型鳥類，身長約 18-19 厘米。
- ◆ 身體由黑、白、灰三種顏色的羽毛組成。
- ◆ 胸口有一片黑色斑紋，外形像嬰兒用的「口水肩」。

### 居留狀況及生境

- ◆ 常見的冬候鳥及春秋過境遷徙鳥，部份為留鳥。廣泛分布於香港。
- ◆ 廣泛分佈於鹹淡水濕地、淡水濕地、開闊原野、溪流、海洋沿岸和海島。

### 習性及有趣資料

- ◆ 主要捕食昆蟲。
- ◆ 飛行姿態十分特別，喜歡以波浪形軌跡飛行。
- ◆ 飛行時會發出「唧 – 唧 – 」的叫聲。

### 在香港濕地公園的理想觀察點

- ◆ 河畔觀鳥屋、泥灘觀鳥屋及生態探索區